




Guide Des Oiseaux Dans Vos Cours



NATURE NB

Mésange à Tête Noire



Description: Les traits distinctifs sont la calotte noire, la joue blanche et la bavette noire. Le dos est d'une couleur grisâtre avec des flancs beiges. Au début du printemps, les flancs peuvent sembler presque roses mais s'éteignent à beige au fur et à mesure que l'année avance.

Voix: Les chansons les plus communes sont *tchika-di-di-di* ou *di-di-di* et *hi-u-u* ou *hi-u*.

Habitat: Forêts de feuillus ou mixtes, éclaircies, et dans les villes et les villages.

Faits: C'est un excellent oiseau à avoir à votre mangeoire. Avec un peu de patience, elles peuvent être enseignés à manger des graines dans votre main! Elles aiment manger des graines de tournesol, des noix et de la graisse de rognon.



Geai Bleu

Description: Les traits distinctifs sont la coloration bleu et la huppe. D'autres traits à rechercher sont les taches blanches sur les ailes et la queue avec le dessous grisâtre et le collier noir.

Voix: Le geai possède un répertoire très varié; les cris les plus fréquents sont un *djé-djé* ou un *tii-oulou tii-oulou* répétés à plusieurs reprises.

Habitat: Forêts de chêne et pin, forêts de feuillus ou mixtes, jardins et parcs.

Faits: Un autre oiseau commun des mangeoires, celui-ci a une réputation d'oiseau agressif. Le geai bleu n'aime pas partager et poursuit d'autres oiseaux hors de son aire de nourrissage. En raison de ce comportement les gens n'apprécient pas toujours cet oiseau à leur mangeoires.

Pic Mineur

Description: Les traits distinctifs sont la raie blanche au milieu du dos, sa petite taille et son petit bec. Il a également une calotte noire, et un motif à carreaux sur les ailes. Seul le mâle porte une tache rouge derrière la tête. L'image à droite est celle d'une femelle; remarquez qu'elle n'a aucune tache rouge.

Voix: La chanson la plus commune est un *pik*. Il donne aussi un cri mitraillé terminant en décroscendo, *ki-ki-ki-ki*.

Habitat: Fréquente divers milieux boisés: forêts de feuillus, forêts mixtes, forêts de conifères, parcs urbains et vergers.

Faits: Aux occasions rares, la tache rouge derrière la tête dans les juvéniles peut être jaune. Également, vous pouvez attirer cet oiseau en mettant de la graisse de rognon près de votre mangeoire.



Merle d'Amérique

Description: Les traits distinctifs sont la poitrine roussâtre et le dos gris foncé. Cet oiseau a également un bec très jaune et des arcs blancs autour des yeux.

Voix: La chanson la plus commune est une longue turlutte sifflée et enjouée, formée de courtes strophes: *turlit turlu*.

Habitat: Des habitats boisé ou arbustif avec des espaces ouverts, fermes, parcs, gazon, villes et villages.

Faits: Ces oiseaux fréquentent souvent les gazons recherchant leur nourriture préférée; les vers de terre.






Chardonneret Jaune

Description: Les traits distinctifs pour le mâle sont sa coloration jaune avec des taches noires sur les ailes, queue et calotte. Il a également des bandes alaires blanches et les sous-caudales blanches.

Voix: La chanson la plus commune est *pe-ti-ti-diou*. Cette chanson est caractéristique durant le vol.

Habitat: Forêts ouvertes, orée des bois, champs et le bord des routes.

Faits: La femelle n'est pas aussi brillamment colorée que le mâle et est souvent plus difficile à identifier. Là où le mâle est jaune lumineux la femelle a tendance à être jaune-olive plus mate. Si vous voulez encourager ces petits oiseaux à visiter votre mangeoire, vous pouvez utiliser des graines de tournesol ou essayer des graines de chardon.



Colibri à Gorge Rubis

Description: Les traits distinctifs pour les mâles sont la gorge rouge lumineuse, le dos iridescent vert et la queue fourchu. La femelle a une gorge blanche et la queue a tendance à être émoussée avec des taches blanches.

Voix: Le bruit le plus commun du colibri est le vrombissement des ailes. Aussi, ils peuvent émettre des cris nasillard quand ils sont en vol ou juché.

Habitat: Les lisières de forêts de feuillus ou mixtes, l'orée des bois, les parcs, près des ruisseaux, l'orée des boursiers et les jardins.

Faits: Il est facile d'attirer ces oiseaux dans votre cour. Achetez une mangeoire à colibri et remplissez-la avec de l'eau sucré. Ils préfèrent la couleur rouge mais soyez certain d'obtenir une mangeoire rouge. **NE TEIGNEZ PAS** le sirop! Pour faire le sirop vous avez besoin d'un mélange d'une partie de sucre pour 4 partie d'eau. Faire bouillir sur la cuisinière, et laisser refroidir et mettre dans votre mangeoire. Nettoyer votre mangeoire entre les remplissages et vous êtes prêt.

Bruant Chanteur

Description: Les traits distinctifs sont la queue longue et arrondie et la poitrine pâle rayé qui porte un point foncé au centre.

Voix: Chant cristallin, fort et rythmé, débutant par trois ou quatre notes détachées et terminé par une note souvent étirée.

Habitat: Les fourrés, l'orée des bois, les pâturages buissonneux, les marécages, le bord des routes et les jardins.

Faits: Ce moineau est probablement le plus répandu de tous les moineaux. Ils aiment visiter les mangeoires mais soyez certain d'utiliser des graines de tournesol. Ces oiseaux sont également sensibles au *pishing*. *Pishing* est un bruit que vous pouvez faire pour attirer les oiseaux. Ce son les rend curieux à découvrir la source du bruit. Allez dehors, essayez le bruit et découvrez quels espèces d'oiseaux répondent.



Tourterelle Triste

Description: Les traits distinctifs sont les proéminentes taches noires sur les ailes et dos et la queue longue et pointu avec des bouts vifs et blancs. Ils ont également un croissant noir juste au-dessous de la joue et un cercle oculaire bleu.

Voix: Une plainte douce et mélancolique, hou-ah-hou-hou-hou. À une distance seulement les trois derniers hou sont audibles.

Habitat: Les champs, les fermes, les villes, les villages, le bord des routes, et les forêts ouvertes. Elles préfèrent les espaces ouverts et ont tendance à éviter les forêts épaisses.

Faits: Ces oiseaux s'alimentent fréquemment au sol ainsi la meilleure manière de les attirer à votre mangeoire est de disperser des graines au sol au-dessous de votre mangeoire d'oiseau. Un autre fait intéressant est que leurs ailes produisent un sifflement à l'envol.



Corneille d'Amérique



Description: Le trait distinctif est la coloration noire partout incluant les jambes et le bec. Cet oiseau est habituellement confondu avec le grand corbeau mais il est plus petit, a un plus petit bec et la queue est ronde contrairement à celle du corbeau qui est cunéiforme.

Voix: Le cri le plus commun est un croassement fort et bien connu, câ-câ-câ.

Habitat: Les forêts, fermes, les champs agricoles, et beaucoup d'autres habitats très variés.

Faits: Les corneilles en fait, sont beaucoup plus intelligente que les gens le pense. Elles peuvent apprendre comment parler et imiter d'autres bruits. Aussi, elles sont l'un des quelques oiseaux qui ont appris comment faire et utiliser les outils simples. Par exemple elles ont été vu en train d'utiliser une roche comme marteau ou un bâton pour pousser des choses.

Paruline Jaune



Description: Les traits distinctifs sont la coloration jaune partout. C'est la seule paruline qui est complètement jaune. Le mâle a les rayures rouge rouille sur la poitrine. La femelle est complètement jaune aussi mais ce n'est pas ci brillant comme le mâle et les rayures sur la poitrine sont extrêmement faibles ou inexistantes.

Voix: La chanson la plus commune est huit-huit-huit-pantalon-huit.

Habitat: Les fourrés, les marécages et le bord des cours d'eau, les bois clairs, les vergers, la lisière des forêts, et les jardins. Elles ont tendance à aimer les espaces mouillé et dominé par les saules.

Faits: Les Paruline jaunes ont une distribution extraordinairement large pour un espèce de paruline et montrent une grande variation géographique. Plus que 40 sous-espèces reconnu de trois groupes généraux qui s'étendent des limites nordiques de l'habitat arbustif du Canada au nord de Amérique du Sud.


Bruant à Gorge Blanche

Description: Les traits distinctifs incluent la gorge blanche, les sourcils jaunes et des rayures sur la tête. La plupart du temps, les rayures sont noires et blanches mais il existe une forme à raies chamois ou les rayures sont brunes et brunes pâles.

Voix: La Chanson la plus commune est où-es-tu-frédéric-frédéric-frédéric.

Habitat: L'orée des forêts conifériennes et mixtes, les fourrés, les broussailles, et les jardins.

Faits: Cet oiseau préfère rester au sol, ainsi la meilleure manière de l'attirer dans votre cour est de lancer quelques graines au sol autour de votre mangeoire. Ceci attirera également d'autres oiseaux de alimentation au sol avec des écureuils.



Étourneau Sansonnet

Description: L'identification de cet oiseau peut être un peu difficile parce qu'ils changent toute l'année. Immédiatement après qu'ils muent, comme montré ici, ils ont des mouchetés blancs. Quand les plumes s'usent, les mouchetés disparaissent complètement laissant l'oiseau pour la plupart du temps, noir.

Ces oiseaux ont un plumage iridescent et un bec jaune pendant l'été.

Voix: Un long gazouillis parsemé d'imitations variées, dont certains chants d'oiseaux.

Habitat: Les villes et villages, les fermes, Les parcs, les champs et une variété des milieux ouverts.

Faits: Tous les étourneaux sansonnet ont été introduits en Amérique du Nord. Dans le début des années 1890, une société de la ville de New York a décidé de relâcher dans le parc central de New York, tous les oiseaux mentionnés dans les œuvres de Shakespeare. Aujourd'hui on en retrouve plus de 200 millions, mais moins d'une centaine de ceux-ci ont été relâché à cette époque.



D'autres oiseaux communs du Nouveau-Brunswick

Bruants (moineau)

- ☐ Bruant à Gorge Blanche
- ☐ Bruant Familier
- ☐ Bruant Hudsonien

Pics-bois

- ☐ Pic Chevelu
- ☐ Grand Pic
- ☐ Pic Maculé
- ☐ Pic Flamboyant

Oiseaux de Proie

- ☐ Urubu à Tête Rouge
- ☐ Pygargue à Tête Blanche
- ☐ Balbuzard Pêcheur
- ☐ Buse à Queue Rousse
- ☐ Busard Saint-Martin
- ☐ Crécerelle d'Amérique
- ☐ Faucon Émerillon
- ☐ Faucon pèlerin
- ☐ Grand-Duc d'Amérique
- ☐ Harfang des Neiges
- ☐ Chouette Rayée

Hirondelles

- ☐ Hirondelle Bicolore
- ☐ Hirondelle de Rivage
- ☐ Hirondelle Rustique

Oiseaux d'Eau

- ☐ Canard Colvert
- ☐ Canard Noir
- ☐ Canard d'Amérique
- ☐ Canard Branchu
- ☐ Canard Chipecu
- ☐ Sarcelle d'Hiver
- ☐ Bernache du Canada
- ☐ Grand Héron
- ☐ Goéland Argenté
- ☐ Goéland Marin
- ☐ Goéland à Bec Cerclé
- ☐ Eider à Duvet

Parulines

- ☐ Paruline Jaune
- ☐ Paruline Flamboyante
- ☐ Paruline Bleue
- ☐ Paruline Azurée
- ☐ Paruline Masquée
- ☐ Paruline à Croupion Jaune
- ☐ Paruline à Tête Cendrée
- ☐ Paruline Noir et Blanc
- ☐ Paruline à Gorge Noire

D'autres Oiseaux

- ☐ Junco Ardoisé
- ☐ Bruant des Neiges
- ☐ Goglu des Prés
- ☐ Jaseur d'Amérique
- ☐ Cardinal Rouge
- ☐ Bec-Croisé Bifascié
- ☐ Sizerin Flammé
- ☐ Gros-Bec Errant
- ☐ Carouge à Épaulettes
- ☐ Roitelet à Couronne Dorée
- ☐ Martin-Pêcheur d'Amérique
- ☐ Moqueur Chat
- ☐ Gélinotte Huppée
- ☐ Pigeon Biset
- ☐ Engoulevent Bois-Pourri
- ☐ Sittelle à Poitrine Rousse
- ☐ Sittelle à Poitrine Blanche
- ☐ Grive des Bois
- ☐ Grive Solitaire
- ☐ Viréo aux Yeux Rouges

Voici votre liste des oiseaux les plus communs du Nouveau-Brunswick. Cocher ces oiseaux quand vous les voyez.

Références:

Peterson, Roger. Peterson field guides - Birds of eastern and Central North America. Houghton Mifflin Co. New York, 1980.

Alderfer, Jonathan. Complete Birds of North America. National Geographic. Washington, D.C., 2006.

Paquin, J. et Caron, G. Guide d'Identification des Oiseaux du Québec et des Maritimes. Éditions Michel Quintin, Waterloo, 2004.

Commandité par:

Ensemble pour nos
Parcs et Promoscience



Créer par:

Samantha Perrin

Photos par:

Jim Wilson, Ralph Eldridge et
US Fish and Wildlife Service

